



## Lippenbandplastik

Tief ansetzende Lippenbänder lassen die beiden oberen Frontzähne häufig sehr weit auseinander stehen, dieses nennt man Diastema. Überweist der Kieferorthopäde rechtzeitig ein Kind bei laufender Behandlung zu einer Lippenbandplastik zum Chirurgen, kann ein Diastema bei vorliegender Bebänderung innerhalb einer Woche verschlossen werden. Die Operation der Lippenbandplastik ist vergleichbar mit der Zungenbandplastik.



*tief inserierendes Lippenbändchen mit Zahnücke*

## Zungenbandplastik

Festgewachsene Zungenbänder führen zu Sprachstörungen, zu einem vermehrten Auftreten von Karies und zum nicht Halten von Prothesen. Die Zunge kann gelöst werden und der Eingriff wird als Zungenbandplastik bezeichnet.

Ankyloglossum: Angeborene Entwicklungsstörung der Zunge, wobei die Zungenspitze durch ein zu kurzes, weit nach vorn an ihre Unterfläche reichendes »angewachsenes« Zungenbändchen (Frenulum linguae) mit dem Mundboden verbunden ist. Oft mit Störung des Saugens u. Sprechens oder Schluckstörung verbunden.



*fixierte Zunge mit Zungenband*